## 【調査1】令和3(2021)年度森林内の放射性セシウムの分布状況調査結果について

# 1. 背景と目的

林野庁は、福島県における森林内部の放射性物質の分布状況を明らかにするため、2011年度から県内の3町村(川内村、大玉村、只見町)に調査地を設け、土壌や落葉、樹木の葉や幹などの部位別に放射性セシウム濃度とその蓄積量を調査し、公表してきたところです。

2021年7月~9月に、2村3箇所(図1)の5林分の調査地で、部位別の放射性セシウム 濃度とその蓄積量を調査したので、結果を報告します。(放射性セシウム濃度の低下や避 難指示区域の解除を受け、2017、2021年度に調査地を見直し)

#### 2. 調査地



図1 調査地と福島第一原子力発電所からの距離

調査地は、事故のあった福島第一原子力発電所から直線距離で26 km~66 km に位置します。今年度は、川内村の4調査地(三ツ石スギ林、三ツ石ヒノキ林、三ツ石コナラ林、金山スギ林)と大玉村の1調査地(大玉コナラ林)で空間線量率を測定したほか、森林内の土壌や落葉層、樹木の葉や枝、幹などの部位別の放射性セシウム濃度を調査し、森林全体の放射性物質の分布・蓄積量を推計しました(表1)。

なお、三ツ石や大玉のコナラ林の実態は落葉広葉樹林ですが、コナラを調査木としている のでコナラ林としています。

# 表 1 調査地の所在地と調査期間

調査地	所在地	調査期間		
三ツ石スギ林	福島県双葉郡川内村下川内(磐城森林管理署	2021年8月19日、24日		
	管内国有林)			
三ツ石ヒノキ林	福島県双葉郡川内村下川内 (村有林)	2021年8月19日、24日		
三ツ石コナラ林	福島県双葉郡川内村上川内 (村有林)	2021年8月19日、23日、25日		
金山スギ林	福島県双葉郡川内村上川内(村有林)	2021年8月18日、23日		
大玉コナラ林	福島県安達郡大玉村玉井(福島森林管理署管	2021年7月28~30日、8月2~3日、		
	内国有林)	9月21~22日		



写真1 三ツ石調査地のスギ林



写真3 三ツ石調査地のコナラ林



写真5 大玉調査地のコナラ林



写真2 三ツ石調査地のヒノキ林



写真4 金山調査地のスギ林

表2 調査地の優占種、林齢、森林管理状況及び空間線量率

調査地	林齢(年)	森林管理	空間線量率(μSv/h)*
三ツ石スギ林	53	育成林	0.75
三ツ石ヒノキ林	36	育成林	0.97
三ツ石コナラ林	36	天然生林	0.76
金山スギ林	65	育成林	0.33
大玉コナラ林	53	天然生林	0.09

<sup>\*2021</sup> 年度の調査期間における地上高 1 m で測定した平均値

#### 3. 方法

各調査地の優占種、林齢等は表2のとおりです。調査・分析は以下のように昨年度と同様の方法で実施しました。空間線量率は、調査地内を10m間隔で測定しました。調査地の森林の成長量などの基礎的な調査を行い、幹の直径と樹高から幹材積や葉、枝の重量を推定しました。

落葉層及び土壌の分析用の試料は、はじめに落葉層(土壌の上にある落葉や落枝とそれらの腐朽した腐植からなる堆積有機物層)を採取し、その後、土壌採取用の円筒(高さ5cm、内径11cm)を用いて4層(0~5、5~10、10~15、15~20cm)から土壌を採取しました。各調査地(の樹木については、6本の調査木を選定し、樹皮を採取した後、成長錐を用いて材を採取しました。その内、3調査地(三ツ石スギ林、三ツ石ヒノキ林、金山スギ林)の葉、枝の採取は、枝・葉が採取可能な4~6本(成長錐を採取した樹木と同じものを2本以上含む)を調査木として選定し、木登りや高枝切鋏により樹冠上層と下層の両方から試料を採取しました。三ツ石及び大玉コナラ林では、樹冠全層から枝・葉を採取しました。材は実験室で心材と辺材に分けました。

樹木の部位別の試料、落葉層、土壌は乾燥・粉砕した後に、ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリ法で乾燥重量当たりの放射性セシウム(Cs-134、Cs-137) 濃度を測定しました。単位面積当たりの放射性セシウム蓄積量は、面積当たりの落葉層、土壌、樹木の各部位の重量に、それぞれの放射性セシウム濃度を乗じて求めました。放射性セシウム濃度が検出限界以下の試料については、Cs-134 と Cs-137 がともに不検出の場合は検出限界値を用いました。Cs-134 だけが不検出の場合は、2011 年 3 月 15 日時点の Cs-134 濃度と Cs-137 濃度の比を 1:1 とし、物理的減衰に基づく理論的な推定式から計算された Cs-134 濃度と Cs-137 濃度の比を用いて、Cs-137 濃度から Cs-134 濃度を推定しました。各林分の放射性セシウム濃度として、その林分で得られたすべての試料の平均値と標準偏差を求めました。以下、放射性セシウム濃度は Cs-134 と Cs-137 の合計とします。なお、今年度の測定値は、2021 年 9 月 1 日を基準日として整理しました。

## 4. 結果

#### (1)空間線量率

2021 年度における地上高 1 m の空間線量率は、三ツ石スギ林は  $0.75\,\mu\text{Sv/h}$ 、三ツ石ヒノキ林は  $0.97\,\mu\text{Sv/h}$ 、三ツ石コナラ林は  $0.76\,\mu\text{Sv/h}$ 、金山スギ林は  $0.33\,\mu\text{Sv/h}$ 、大玉スギ林は

 $0.09\,\mu Sv/h$  で原子力発電所から遠いほど低い値でした(図 2)。また、2021 年度の値は前々年度比で  $81{\sim}85\%$ でした(2020 年度の川内村の空間線量率の値は、少雨等の気象条件の影響を受けて土壌含水率が低下し、高く見積もられた可能性があるため、前年度の 2020 年ではなく、前々年度の 2019 年の値と比較しました)。なお、2011 年度から調査を継続している三ツ石スギ林の空間線量率は 2011 年度の値の 25%、大玉コナラ林は 27%でした。




図2 2011~2021 年度の調査地における空間線量率(平均値)の変化 (細線は標準偏差)

## (2) 部位別の放射性セシウム濃度の変化

葉や枝、樹皮など樹木の部位別の放射性セシウム濃度は、2011年度の調査開始以来、全体として低下傾向が続いてきました(図3~7)。2021年度は、葉の放射性セシウム濃度は前回の調査よりわずかに上昇あるいは低下し、枝は全ての調査地で前回調査よりも濃度が減少しました。事故後初期と比較すると、枝葉ともに放射性セシウム濃度の低下傾向の鈍化が明瞭になってきました。また、木材内部の心材と辺材の放射性セシウム濃度については、三ツ石スギ林、三ツ石ヒノキ林では2015~2016年度頃から辺材、心材ともに大きな変動が見られなくなってきています。一方で、金山スギ林の心材の放射性セシウム濃度は、2018年度頃まで増加傾向が続き、2019年度及び2020年度の濃度は2018年度の調査よりも低い値でしたが、2021年度の濃度は2018年度と同程度でした。また、いずれの調査地でも、辺材・心材は他の部位に比べて低い濃度で推移しています。

落葉層の濃度は、全ての調査地で前回の調査と概ね同等の濃度を示しており、全体的に 濃度の低下傾向の鈍化が見られました。

土壌は、昨年度までと同様、表層土壌 $0\sim5\,\mathrm{cm}$ の濃度が最も高く、 $5\,\mathrm{cm}$ より深い層は最大でもその13%以下の濃度で、下層ほど低下する傾向を示しました。 $0\sim5\,\mathrm{cm}$ の濃度について、2021年度は三ツ石ヒノキ林、三ツ石コナラ林でこれまでで最も高い濃度となりました。しかし、全体としては2013年度以降、濃度の上昇と低下が混在し、明瞭な傾向は見られませんでした。 $5\,\mathrm{cm}$ より深い層の濃度について、三ツ石スギ林の $5\sim10\,\mathrm{cm}$ の濃度は2020年度に、金山スギ林の $5\sim10\,\mathrm{cm}$ の濃度は2018年度に、これまでの調査の中で最も高い濃度を示しましたが、2021年度は両者ともそれらより低い濃度でした。 $5\,\mathrm{cm}$ より深い層の濃度は、全体として明瞭な変化が見られませんでした。




図3 三ツ石スギ林における部位別放射性セシウム濃度(kBq/kg、平均値、有効数字 2桁)の変化

(細線は標準偏差。今年度の測定結果は青文字で表記。)

#### 三ツ石ヒノキ林




図4 三ツ石ヒノキ林における部位別放射性セシウム濃度(kBq/kg、平均値、有効数字 2桁)の変化

(細線は標準偏差。2011 年度は測定なし。今年度の測定結果は青文字で表記。)

## 三ツ石コナラ林




図5 三ツ石コナラ林における部位別放射性セシウム濃度(kBq/kg、平均値、有効数字 2桁)の変化

(細線は標準偏差。2011 年度は測定なし。樹木部位別濃度は優占種のもの。今年度の測定 結果は青文字で表記。)

# 金山スギ林




図6 金山スギ林における部位別放射性セシウム濃度(kBq/kg、平均値、有効数字2桁) の変化

(細線は標準偏差。2011 年度は測定なし。今年度の測定結果は青文字で表記。)

## 大玉コナラ林




図7 大玉コナラ林における部位別放射性セシウム濃度(kBq/kg、平均値、有効数字 2桁)の変化

(細線は標準偏差。2018 年度と 2020 年度は測定なし。樹木部位別濃度は優占種のもの。今年度の測定結果は青文字で表記。)

# (3) 森林全体の放射性セシウム蓄積量と分布の変化

森林全体の放射性セシウム蓄積量は、いずれの調査地でも明瞭な変化傾向は見られませんでした(図8)。




図8 2011~2021 年度の森林全体の放射性セシウム蓄積量(平均値)の変化 (細線は標準偏差)

2011 年度から測定している三ツ石スギ林と大玉コナラ林について、森林内における樹木及び土壌の部位別の放射性セシウム蓄積量の割合をみると、2011 年度から 2012 年度にかけて土壌の割合が急激に増え、その他の部位の割合が低下するなど大きな変化を示しましたが、2012 年度以降、2021 年度までの変化は小さなものでした(図9、表3)。

いずれの調査地でも土壌に分布する放射性セシウムの割合は年々増加もしくはほぼ同じ値を示し、2021 年度には全体の 85~96%となっていました。落葉層の分布割合は年々低下する傾向にありますが、調査地ごとにその低下速度は異なっていました。三ツ石スギ林や大玉コナラ林では急激に減少し 2021 年度までに3%以下となりましたが、三ツ石ヒノキ林や金山スギ林では2021 年度においても10%が落葉層に存在していました。葉や枝等の樹木に存在する放射性セシウム蓄積量は2015年度まで減少傾向が続いていましたが、2016年度以降大きな変化は見られなくなっています。




図9 2011〜2021 年度における各調査地の放射性セシウム蓄積量の部位別分布割合 (注) 2013〜2016 年度、2018 年度、2020 年度の調査結果は省略。

表3 2011~2021 年度における各調査地の放射性セシウム蓄積量の部位別分布割合 (2011 年度~2016 年度)

三ツ石スギ林	葉 枝 樹皮	2011	2012 7 %, 5 %	2013	2014	2015	2016
三ツ石ス		32 %, 9 %	7 % 5 %	0.0/ 0.0/			
三ツ石ス	樹皮		7 70, 0 70	2 %, 3 %	0.9 %, 1 %	0.9 %, 1 %	0.3 %, 0.6 %
ツ石マ		4 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %
<b>ユ</b>	材	0.2 %	0.4 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %
マイ ギー	落葉層	32 %	17 %	19 %	19 %	9 %	6 %
林	土壌	23 %	68 %	72 %	77 %	87 %	91 %
	合計蓄積量*	1240±287	1019±358	972 <b>±</b> 297	910±269	946±544	946±376
	葉、枝	-	12 %, 4 %	7 %, 2 %	5 %, 1 %	3 %, 1 %	0.8 %, 0.7 %
=	樹皮	-	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
右	材	-	0.3 %	0.4 %	0.7 %	0.8 %	1 %
7	落葉層	-	44 %	49 %	37 %	50 %	50 %
三ツ石ヒノキ林	土壌	-	37 %	39 %	54 %	43 %	45 %
	合計蓄積量*	-	991±290	829±194	792±190	940±352	802±244
	葉、枝	-	-	-	=	0.4 %, 1 %	0.5 %, 1 %
=	樹皮	-	-	-	=	4 %	4 %
互	材	-	-	-	-	0.8 %	1 %
三ツ石コナラ林	落葉層	-	-	-	=	37 %	20 %
林	土壌	-	-	-	=	57 %	73 %
	合計蓄積量*	-	-	-	-	551±162	443±98
	葉、枝	-	12 %, 16 %	8 %, 13 %	4 %, 4 %	2 %, 3 %	2 %, 2 %
全	樹皮	_	0.9 %	1 %	1 %	1 %	1 %
金山スギ林	材	-	0.5 %	0.5 %	0.7 %	0.8 %	2 %
ヂ	落葉層	-	49 %	52 %	46 %	31 %	35 %
杯	土壌	_	22 %	25 %	44 %	61 %	59 %
	合計蓄積量*	_	407±132	455±148	400±115	308±132	305±131
	葉、枝	8 %, 7 %	0.6 %, 3 %	0.1 %, 2 %	0.1 %, 1 %	0.1 %, 0.5 %	0.1 %, 0.5 %
大	樹皮	2 %	1 %	1 %	0.6 %	0.7 %	0.6 %
大玉コナラ林	材	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.2 %
ナラ	落葉層	50 %	21 %	20 %	18 %	11 %	7 %
林	土壌	32 %	74 %	77 %	80 %	87 %	91 %
	合計蓄積量*	91±29	103±46	95 <b>±</b> 37	72±19	73 <b>±</b> 22	58±16

<sup>\*</sup>単位はkBq/m²

表3 (続き) 2011~2021 年度における各調査地の放射性セシウム蓄積量の部位別分布割合 (2017 年度~2021 年度)

葉枝							
対抗			2017	2018	2019	2020	2021
対	Ш	葉枝	0.4 %, 0.7 %	0.2 %, 0.6 %	0.3 %, 0.6 %	0.2 %, 0.4 %	0.3 %, 0.3 %
会計蓄積量* 716±265 862±334 660±319 882±404 816±4 葉 枝 2% 0.5% 0.8% 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.9% 0.9% 0.1% 付 1% 1% 1% 1% 1% 2% 落葉層 35% 31% 20% 43% 10% 金計蓄積量* 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1		樹皮	2 %	2 %	2 %	1 %	0.8 %
会計蓄積量* 716±265 862±334 660±319 882±404 816±4  葉 枝 2 % 0.5 % 0.8 % 0.8 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.9	ガ石	材	1 %	0.8 %	1 %	0.8 %	0.8 %
会計蓄積量* 716±265 862±334 660±319 882±404 816±4  葉 枝 2%,0.5% 0.8%,0.8% 0.5%,0.5% 0.8%,0.5% 0.9%,0.0  樹皮 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 材 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 落葉層 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1  葉 枝 0.6%,1% 0.4%,0.8% 0.6%,1% 0.5%,0.9% 0.4%,0.3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%	スギ	落葉層	6 %	3 %	5 %	2 %	2 %
菜枝       2%0.5%       0.8%0.8%       0.5%0.5%       0.8%0.5%       0.9%0.0%         樹皮       2%       3%       2%       2%       2%         材       1%       1%       1%       1%       1%       2%         茶葉層       35%       31%       20%       43%       10%         土壌       60%       64%       76%       53%       85%         合計蓄積量*       1002±531       626±306       866±270       818±378       690±1         菜枝       0.6%1%       0.4%0.8%       0.6%1%       0.5%0.9%       0.4%0.9%         材       2%       2%       2%       2%       2%         材       2%       2%       2%       2%       2%         大葉層       20%       10%       13%       3%       5%         合計蓄積量*       441±93       548±93       373±157       504±163       530±1         葉枝       3%2%       0.9%2%       1%1%       1%1%       1%0.8         樹皮       1%       1%       1%1%       1%3       3%         本社集       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84 <th>林</th> <th>土壌</th> <th>90 %</th> <th>94 %</th> <th>92 %</th> <th>96 %</th> <th>96 %</th>	林	土壌	90 %	94 %	92 %	96 %	96 %
樹皮		合計蓄積量*	716±265	862±334	660±319	882±404	816±475
会計蓄積量* 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1 葉 枝 0.6%、1% 0.4%、0.8% 0.6%、1% 0.5%、0.9% 0.4%、0.0 樹皮 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 落葉層 20% 10% 13% 3% 3% 5% 台計蓄積量* 441±93 548±93 373±157 504±163 530±7 が 1% 1% 1% 1%、1% 1%、1%、1% 1%、0.8% が 対 1% 2% 2% 1% 3% 落葉層 16% 14% 24% 17% 10% 土壌 77% 79% 71% 78% 85% 6計蓄積量* 347±119 317±96 275±84 309±164 252±7 が 対 0.3% - 0.1%、0.3% - 0.1%、0.3% オ 0.3% - 0.1% 0.2% 落葉層 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.3% 济 ブ 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.2% バ 0		葉枝	2 %, 0.5 %	0.8 %, 0.8 %	0.5 %, 0.5 %	0.8 %, 0.5 %	0.9 %, 0.6 %
会計蓄積量* 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1 葉 枝 0.6%、1% 0.4%、0.8% 0.6%、1% 0.5%、0.9% 0.4%、0.0 樹皮 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 落葉層 20% 10% 13% 3% 3% 5% 台計蓄積量* 441±93 548±93 373±157 504±163 530±7 が 1% 1% 1% 1%、1% 1%、1%、1% 1%、0.8% が 対 1% 2% 2% 1% 3% 落葉層 16% 14% 24% 17% 10% 土壌 77% 79% 71% 78% 85% 6計蓄積量* 347±119 317±96 275±84 309±164 252±7 が 対 0.3% - 0.1%、0.3% - 0.1%、0.3% オ 0.3% - 0.1% 0.2% 落葉層 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.3% 济 ブ 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.2% バ 0	=	樹皮	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %
会計蓄積量* 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1 葉 枝 0.6%、1% 0.4%、0.8% 0.6%、1% 0.5%、0.9% 0.4%、0.0 樹皮 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 落葉層 20% 10% 13% 3% 3% 5% 台計蓄積量* 441±93 548±93 373±157 504±163 530±7 が 1% 1% 1% 1%、1% 1%、1%、1% 1%、0.8% が 対 1% 2% 2% 1% 3% 落葉層 16% 14% 24% 17% 10% 土壌 77% 79% 71% 78% 85% 6計蓄積量* 347±119 317±96 275±84 309±164 252±7 が 対 0.3% - 0.1%、0.3% - 0.1%、0.3% オ 0.3% - 0.1% 0.2% 落葉層 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.3% 济 ブ 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.2% バ 0	右	材	1 %	1 %	1 %	1 %	2 %
会計蓄積量* 1002±531 626±306 866±270 818±378 690±1 葉 枝 0.6%、1% 0.4%、0.8% 0.6%、1% 0.5%、0.9% 0.4%、0.0 樹皮 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 落葉層 20% 10% 13% 3% 3% 5% 台計蓄積量* 441±93 548±93 373±157 504±163 530±7 が 1% 1% 1% 1%、1% 1%、1%、1% 1%、0.8% が 対 1% 2% 2% 1% 3% 落葉層 16% 14% 24% 17% 10% 土壌 77% 79% 71% 78% 85% 6計蓄積量* 347±119 317±96 275±84 309±164 252±7 が 対 0.3% - 0.1%、0.3% - 0.1%、0.3% オ 0.3% - 0.1% 0.2% 落葉層 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% 0.3% - 0.3% 济 ブ 0.1% - 0.2% 济 対 0.3% - 0.1% - 0.2% 济 対 0.2% バ 0	7	落葉層	35 %	31 %	20 %	43 %	10 %
葉枝 0.6 % 1 % 0.4 % 0.8 % 0.6 % 1 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.4 % 0.5 % 0.9 % 0.8 % 0.5 % 0.9 % 0.8 % 0.9 % 0.8 % 0.9 % 0.8 % 0.9 % 0.8 % 0.9 % 0.8 % 0.9 % 0.9 % 0.8 % 0.9 %	林	土壌	60 %	64 %	76 %	53 %	85 %
樹皮   3%   3%   3%   3%   2%   2%   2%   2%		合計蓄積量*	1002±531	626±306	866±270	818±378	690±172
合計蓄積量*       441±93       548±93       373±157       504±163       530±7         葉枝       3%, 2%       0.9%, 2%       1%, 1%       1%, 1%       1%, 0.8         樹皮       1%       1%       1%       0.9%       0.8%         材       1%       2%       2%       1%       3%         落葉層       16%       14%       24%       17%       10%         土壌       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84       309±164       252±7         葉枝       0.2%, 0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         村皮       0.5%       -       0.4%       -       0.3%         村皮       0.3%       -       0.1%       -       0.2%         茶葉層       3%       -       2%       -       3%		葉枝	0.6 %, 1 %	0.4 %, 0.8 %	0.6 %, 1 %	0.5 %, 0.9 %	0.4 %, 0.7 %
合計蓄積量*       441±93       548±93       373±157       504±163       530±7         葉枝       3%, 2%       0.9%, 2%       1%, 1%       1%, 1%       1%, 0.8         樹皮       1%       1%       1%       0.9%       0.8%         材       1%       2%       2%       1%       3%         落葉層       16%       14%       24%       17%       10%         土壌       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84       309±164       252±7         葉枝       0.2%, 0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         村皮       0.5%       -       0.4%       -       0.3%         村皮       0.3%       -       0.1%       -       0.2%         茶葉層       3%       -       2%       -       3%	=	樹皮	3 %	3 %	3 %	3 %	2 %
合計蓄積量*       441±93       548±93       373±157       504±163       530±7         葉枝       3%, 2%       0.9%, 2%       1%, 1%       1%, 1%       1%, 0.8         樹皮       1%       1%       1%       0.9%       0.8%         材       1%       2%       2%       1%       3%         落葉層       16%       14%       24%       17%       10%         土壌       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84       309±164       252±7         葉枝       0.2%, 0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         大工       村皮       0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         大工       村皮       0.3%       -       0.1%       -       0.2%         茶葉層       3%       -       2%       -       3%	有	材	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
合計蓄積量*       441±93       548±93       373±157       504±163       530±7         葉枝       3%, 2%       0.9%, 2%       1%, 1%       1%, 1%       1%, 0.8         樹皮       1%       1%       1%       0.9%       0.8%         材       1%       2%       2%       1%       3%         落葉層       16%       14%       24%       17%       10%         土壌       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84       309±164       252±7         葉枝       0.2%, 0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         大工       村皮       0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         大工       村皮       0.3%       -       0.1%       -       0.2%         茶葉層       3%       -       2%       -       3%	ᆂ	落葉層	20 %	10 %	13 %	3 %	5 %
葉枝       3%, 2%       0.9%, 2%       1%, 1%       1%, 1%       1%, 0.8         樹皮       1%       1%       1%       0.9%       0.8%         材       1%       2%       2%       1%       3%         落葉層       16%       14%       24%       17%       10%         土壌       77%       79%       71%       78%       85%         合計蓄積量*       347±119       317±96       275±84       309±164       252±7         葉枝       0.2%, 0.5%       -       0.1%, 0.3%       -       0.1%, 0.3%         材       0.5%       -       0.4%       -       0.3%         材       0.3%       -       0.1%       -       0.2%         落葉層       3%       -       2%       -       3%	林	土壌	72 %	85 %	80 %	91 %	90 %
樹皮		合計蓄積量*	441±93	548±93	373±157	504±163	530±72
金山 スギ林     材     1%     2%     2%     1%     3%       落葉層     16%     14%     24%     17%     10%       土壌     77%     79%     71%     78%     85%       合計蓄積量*     347±119     317±96     275±84     309±164     252±7       葉 枝     0.2%, 0.5%     -     0.1%, 0.3%     -     0.1%, 0.3%       村皮     0.5%     -     0.4%     -     0.3%       村     0.3%     -     0.1%     -     0.2%       落葉層     3%     -     2%     -     3%		葉枝	3%, 2%	0.9%, 2%	1%, 1%	1%, 1%	1%, 0.81%
大工場     77%     79%     71%     78%     85%       合計蓄積量*     347±119     317±96     275±84     309±164     252±7       葉枝     0.2 % 0.5 %     -     0.1 % 0.3 %     -     0.1 % 0.3 %       材皮     0.5 %     -     0.4 %     -     0.3 %       材     0.3 %     -     0.1 %     -     0.2 %       落葉層     3 %     -     2 %     -     3 %	소	樹皮	1 %	1 %	1 %	0.9 %	0.8 %
大工事     77%     79%     71%     78%     85%       合計蓄積量*     347±119     317±96     275±84     309±164     252±7       葉枝     0.2 %, 0.5 %     -     0.1 %, 0.3 %     -     0.1 %, 0.3 %       材皮     0.5 %     -     0.4 %     -     0.3 %       材     0.3 %     -     0.1 %     -     0.2 %       落葉層     3 %     -     2 %     -     3 %	当	材	1 %	2 %	2 %	1 %	3 %
大工場     77%     79%     71%     78%     85%       合計蓄積量*     347±119     317±96     275±84     309±164     252±7       葉枝     0.2 % 0.5 %     -     0.1 % 0.3 %     -     0.1 % 0.3 %       材皮     0.5 %     -     0.4 %     -     0.3 %       材     0.3 %     -     0.1 %     -     0.2 %       落葉層     3 %     -     2 %     -     3 %	<b>ヘ</b> ギ	落葉層	16 %	14 %	24 %	17 %	10 %
葉枝     0.2%, 0.5%     -     0.1%, 0.3%     -     0.1%, 0.3%       樹皮     0.5%     -     0.4%     -     0.3%       材     0.3%     -     0.1%     -     0.2%       落葉層     3%     -     2%     -     3%	杯	土壌	77 %	79 %	71 %	78 %	85 %
大玉子子 樹皮     0.5 %     -     0.4 %     -     0.3 %       材     0.3 %     -     0.1 %     -     0.2 %       落葉層     3 %     -     2 %     -     3 %		合計蓄積量*	347±119	317±96	275±84	309±164	252±70
芸力     材     0.3 %     -     0.1 %     -     0.2 %       落葉層     3 %     -     2 %     -     3 %		葉 枝	0.2 %, 0.5 %	_	0.1 %, 0.3 %	_	0.1 %, 0.2 %
芸力     材     0.3%     -     0.1%     -     0.2%       落葉層     3%     -     2%     -     3%       土壌     95%     -     97%     -     96%	大	樹皮	0.5 %	-	0.4 %	_	0.3 %
大ラ	玉	材	0.3 %	_	0.1 %	_	0.2 %
<b>林</b> 土壌 95% - 97% - 96%	ナラ	落葉層	3 %	-	2 %	-	3 %
	林	土壌	95 %	_	97 %	_	96 %
合計蓄積量* 76±32 - 55±15 - 51±2		合計蓄積量*	76±32	-	55±15	-	51±20

<sup>\*</sup>単位はkBq/m²

## 5. 考察

#### (1)空間線量率の変化

2011 年度から 2012 年度にかけての空間線量率の低下は放射性セシウムの物理的減衰よりも小さく、これは森林内の放射性セシウムの分布が樹木の樹冠から林床の落葉層や土壌表層に移行したことが一因と推測しました。その後空間線量率は、毎年、物理的減衰を反映するように低下していました。前年度は、物理的減衰以外の変動要因(気象条件など)の空間線量率への影響が考えられましたが、2021 年度の空間線量率は、前々年度と比べ、物理的減衰を反映するように低下していたと考えられます。

## (2) 部位別濃度と分布の変化

葉や枝、樹皮など樹木の放射性セシウム濃度は、2011 年度から 2012 年度にかけて大幅に低下しました。濃度低下は、放射性セシウムの物理的減衰とともに、雨によって放射性セシウムが洗い流された(洗脱)ためと考えられました。このような移動しやすい放射性セシウムの動きが収まったため、2012 年度以降の濃度の変化は比較的小さかったと考えられます。

スギやヒノキなど常緑樹の葉における濃度低下は、雨による洗脱のほか、旧葉の落葉と新しい葉の伸張による置き換わりが続いた影響と考えられます。一方、毎年開葉と落葉を繰り返すコナラの葉の濃度は、大玉では 100~580 Bq/kg、三ツ石では 5,400~10,500 Bq/kgの範囲で変動し、明瞭な変化傾向は見られていません。

枝の放射性セシウム濃度は低下傾向にありますが、2011 年度から2014 年度までの低下に比べて2014 年度以降の濃度低下は緩やかになり、明瞭な変化傾向が見られなくなってきています。樹皮の濃度も低下傾向にありますが、枝に比べて濃度の低下は緩やかです。

木材中の放射性セシウム濃度は 2011 年度から大きく変動していないことから、事故直後に取り込まれた放射性セシウムが樹木内部に留まっていると推察されます。コナラやヒノキの辺材、一部のスギの心材では、これまでに濃度の増加傾向がみられたことから、樹木の根による吸収が起きている可能性があります。しかし、材以外の他の部位においては明瞭な増加は認められないことから、森林内における部位別の放射性セシウム蓄積割合を大きく変えるほど多くの吸収は起きていないと考えられます。また、スギでは辺材から心材に向けてセシウムが移動することが様々な研究で示唆されており、今回の調査でもスギ心材の放射性セシウム濃度が辺材に比べてやや高い傾向が見られました。今後も調査を継続し、樹木への吸収や樹体内分布の変化を注視していく必要があります。

2011 年度から 2012 年度にかけて三ツ石スギ林では落葉層の放射性セシウム濃度が半分以下に低下しました。それに対して、表層土壌( $0\sim5\,\mathrm{cm}$ )の放射性セシウム濃度は、樹木や落葉層から洗脱・溶脱した放射性セシウムが土壌の表層で保持された結果、2012 年度に増加しました。2012 年度以降、いずれの調査地でも落葉層の濃度は低下傾向が見られますが、2021 年度は前年度と概ね同等の濃度となっており、低下傾向の鈍化が見られます。表層土壌( $0\sim5\,\mathrm{cm}$ )の濃度について、2021 年度は三ツ石コナラ林、三ツ石ヒノキ林でこれまでで最も高い濃度が見られましたが、2013 年以降の表層土壌( $0\sim5\,\mathrm{cm}$ )では、濃度変化に一定の傾向は確認できませんでした。 $5\,\mathrm{cm}$  より深い層の土壌の放射性セシウ

ム濃度は表層より大幅に低い状態が続いており、増減はあるものの、明瞭な変化は見られませんでした。以上より、放射性セシウムは土壌表層付近に留まり、地下への浸透はあまり進んでいないと考えられます。

#### (3) 放射性セシウム分布割合と森林全体の蓄積量の評価

森林内に蓄積した放射性セシウムの部位別の分布割合は、放射性セシウムの濃度変化を反映し、2011 年度から 2012 年度にかけて樹木の割合が低下し、落葉層や土壌の割合が大きく増加しました。落葉層の割合は年々減少する傾向が認められますが、落葉層中の蓄積割合は林分ごとに異なり、2021 年度において三ツ石スギ林では 2%と低く、三ツ石ヒノキ林や金山スギ林では 10%と高くなっていました。このような違いがどうして生じたかを明らかにするために、さらに調査が必要です。

森林全体の放射性セシウム蓄積量は、明瞭な変化を確認できませんでした。樹木の蓄積量は6%以下であり、落葉層や土壌の放射性セシウム濃度や蓄積量のばらつきによるセシウム分布の不均一性が、森林全体の蓄積量の推定誤差を大きくしていると考えられます。推定誤差は大きいものの、森林全体の放射性セシウム蓄積量が明瞭に変化していないことから、森林に沈着した放射性セシウムは、分布の主体を土壌に移行しつつ、森林内に留まっているものと考えられます。

#### (4) 森林生態系の放射性セシウムの循環

チェルノブイリの調査等から放射性セシウムは森林生態系に留まり、その一部は内部循環するといわれています。一方、セシウム循環には樹種や土壌の違いによる影響も大きいことが知られています。これまでの調査から、2011年度当時、福島第一原子力発電所の事故で上空から降下した放射性セシウムは、常緑樹や落葉樹といった樹木の形状の違いを反映し、部位別の濃度に差が認められました。しかし、放射性セシウムは比較的移動しやすく、2012年度には樹木に付着した放射性セシウムの多くが土壌や落葉層に移動しました。その後は樹体に分布する放射性セシウムの割合が少しずつ低下し、落葉層に分布する割合も低下する一方、土壌に分布する割合が増加しましたが、その変化は小さく推移しています。樹木は根を通じて土壌から放射性セシウムを吸収しますが、木材中の放射性セシウム濃度の変化は小さく、また樹体内のセシウム分布の変化もあり、これまでの調査からはセシウムの吸収量を正確に見積もることができませんでした。しかし、これまでの調査結果から、少なくとも40~50年生程度の森林では、木材として利用される辺材や心材への樹木による放射性セシウムの吸収・蓄積は少ないと考えられます。

さらに、森林全体の放射性セシウムの蓄積量の変化が少なく、かつ大部分が土壌表層付近に留まっている状況や渓流水中の放射性セシウム濃度の調査結果等から、放射性セシウムは森林内に留まり、森林外への流出量は少ないと考えられます。

森林生態系における放射性セシウムの動態を解明し、森林・林業の再生へ向けた対策に 役立てるため、今後も継続して調査が必要です。